

SARA MEDIC CENTER

CATÁLOGO ONCOLÓGICO

MEDICAMENTOS Y SOLUCIONES ONCOLÓGICAS

2027

Exclusivo para médicos, instituciones y pacientes.

www.smedicalc.mx

Bienvenido a Sara Medic Center

Sara Medic Center es un Centro Médico Integral y Farmacia que ofrece atención médica, seguimiento especializado y acceso a medicamentos de alta especialidad, con un enfoque en la salud, el bienestar y la calidad de vida de nuestros pacientes.

Contamos con un portafolio de medicamentos oncológicos de laboratorios autorizados, con procesos seguros de adquisición, manejo y conservación, que garantizan la calidad y la eficacia de cada tratamiento.

Brindamos acompañamiento médico y farmacéutico profesional, con atención personalizada, orientación terapéutica y gestión eficiente del tratamiento, para que pacientes, médicos y hospitales cuenten con soluciones confiables y oportunas.

¿Por qué elegir Sara Medic Center?

- Medicamentos oncológicos originales de laboratorios autorizados.
- Atención médica integral y especializada.
- Manejo profesional con cadena de frío.
- Asesoría farmacéutica y acompañamiento durante el tratamiento.
- Abasto confiable y entrega oportuna.
- Programas de apoyo para pacientes y profesionales de la salud.



Compre su tratamiento en cuatro pasos

Comprar su tratamiento con Sara Medic Center es un proceso sencillo, seguro y acompañado por un equipo especializado. Atendemos a pacientes, médicos, hospitales e instituciones, brindando orientación durante todo el proceso de compra y suministro.

01 Contáctenos por WhatsApp, teléfono o a través de nuestro sitio web para consultar disponibilidad, precio y tiempo estimado de entrega del medicamento o insumo que necesita.

02 Uno de nuestros asesores verificará existencias, validará la información requerida y responderá cualquier duda relacionada con su tratamiento o pedido institucional.

03 Le compartiremos las opciones de pago disponibles. Aceptamos transferencia bancaria y otros medios autorizados. En compras institucionales, el proceso puede incluir validación administrativa adicional.

04 Envíe su comprobante de pago y, cuando aplique, su receta médica vigente. Una vez validada la información, prepararemos su pedido y le compartiremos el seguimiento correspondiente.

Envíos

Realizamos envíos a toda la República Mexicana. Los pedidos confirmados oportunamente se procesan de acuerdo con disponibilidad y destino. En algunas zonas se pueden ofrecer tiempos de entrega más ágiles según cobertura logística.

Medicamentos refrigerados

Los medicamentos que requieren conservación especial son preparados y enviados con las medidas necesarias para mantener la cadena de frío durante el traslado, conforme a las condiciones del producto.

Información importante

Algunos medicamentos de alta especialidad requieren receta médica vigente para su dispensación. La documentación será validada por nuestro equipo antes del envío. La disponibilidad de ciertos productos está sujeta a existencias y lineamientos aplicables.

¿Necesita ayuda? Escríbanos por WhatsApp www.smedicalc.mx

ONCOLOGÍA MÉDICA

Anemia por enfermedad renal crónica y quimioterapia 06
Carcinoma de células renales 08
Carcinoma hepatocelular 10
Cáncer colorrectal metastásico 12
Cáncer de endometrio 14
Cáncer de mama HER2 positivo 15
Cáncer de mama HR+ / HER2 negativo 17
Cáncer de ovario 19
Cáncer de próstata 21
Cáncer de pulmón (inmunoterapia y antiangiogénicos) 23
Cáncer de pulmón CPCNP con mutación (EGFR / ALK) 25
Cáncer de páncreas 27
Cáncer de tiroides 29
Cáncer de vejiga 30
Cáncer gástrico y esofágico 31
Glioblastoma y tumores del SNC 33
Linfoma Hodgkin y no Hodgkin 35
Melanoma avanzado 37
Neutropenia y soporte en quimioterapia 39
Náusea y vómito inducidos por quimioterapia 41
Osteoporosis y salud ósea 43
Sarcoma de tejidos blandos y GIST 44
Tumores neuroendocrinos 46

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

Bienvenido a Sara Medic Center 02
¿Cómo realizar su pedido? 03
Programa para Médicos Afiliados 05
Medicamentos bajo pedido 48
Estamos para ayudarle 50

Programa para Médicos Afiliados

AFÍLIATE A NUESTRO PROGRAMA, RECIBE BENEFICIOS EXCLUSIVOS Y REFERENCIAS DE PACIENTES



En **Sara Medic Center** creemos que el acceso a medicamentos de alta especialidad debe ser un proceso ágil, seguro y cercano para médicos y pacientes. Por ello, desarrollamos nuestro **Programa para Médicos Afiliados**, una iniciativa diseñada para crear relaciones de largo plazo con especialistas comprometidos con la mejor atención médica.

Al afiliarte, tendrás el respaldo de un equipo especializado que te acompañará en la búsqueda, cotización y suministro de medicamentos oncológicos, hematológicos, inmunológicos y de alta especialidad, incluyendo tratamientos de difícil acceso.

Beneficios para médicos afiliados

- Cotizaciones y precios preferenciales para médicos registrados.
- Acceso a medicamentos de alta especialidad y difícil acceso.
- Atención personalizada y seguimiento de solicitudes vía WhatsApp.
- Acceso prioritario a nuevos tratamientos y presentaciones.
- Publicación en nuestro Directorio de Médicos Afiliados.

¿Cómo funciona?

01
Solicita tu afiliación.

02
Comparte tu cédula profesional, especialidad y datos de tu consultorio.

03
Nuestro equipo valida tu registro y activa tu cuenta de médico afiliado.

04
Comienza a solicitar cotizaciones con condiciones preferenciales para tus pacientes.

Tratamientos Especializados

Contamos con un portafolio de tratamientos innovadores, medicamentos recientemente incorporados al mercado y terapias de alta especialidad. Trabajamos con fabricantes, distribuidores nacionales e internacionales y proveedores especializados para ofrecerte alternativas de suministro de forma rápida, segura y confiable.

¿Te gustaría formar parte del Programa para Médicos Afiliados?

Nuestro equipo puede darte de alta en pocos minutos.

AFÍLIARME COMO MÉDICO

Escríbenos por WhatsApp al **+52 33 2065 3161**

ONCOLOGÍA MÉDICA

Anemia por enfermedad renal crónica y quimioterapia



Aranesp

Caja con 4 jeringas de 40 mcg / 0.4 mL

Darbepoetina alfa AMGEN

INDICACIÓN
Anemia por enfermedad renal crónica y anemia inducida por quimioterapia

PRESENTACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Caja con 4 jeringas de 40 mcg / 0.4 mL · Vía subcutánea

CONSERVACIÓN
CADENA DE FRÍO: refrigerado 2–8 °C, no congelar

MECANISMO DE ACCIÓN
Estimulante de la eritropoyesis de acción prolongada; agonista del receptor de eritropoyetina

ADVERTENCIA IMPORTANTE
No exceder hemoglobina de 11-12 g/dL por riesgo trombótico y cardiovascular

APLICACIÓN O NIVEL DE ATENCIÓN
Ambulatorio · el paciente puede autoadministrarlo con capacitación

COTIZAR AHORA

Whatsapp 5545546566



Bioyetin

Caja con 6 ámpulas de 4,000 UI

Eritropoyetina alfa PROBIOMED

INDICACIÓN
Anemia de la enfermedad renal crónica en diálisis y prediálisis

PRESENTACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Caja con 6 ámpulas de 4,000 UI · Vía subcutánea

CONSERVACIÓN
CADENA DE FRÍO: refrigerado 2–8 °C, no congelar

MECANISMO DE ACCIÓN
Eritropoyetina humana recombinante; agonista del receptor de eritropoyetina

ADVERTENCIA IMPORTANTE
No exceder hemoglobina de 12 g/dL; vigilar presión arterial y reservas de hierro

APLICACIÓN O NIVEL DE ATENCIÓN
Ambulatorio · aplicación por personal de salud

COTIZAR AHORA

Whatsapp 5545546566



Eporatio

Jeringa de 30,000 UI

Epoetina theta TEVA

INDICACIÓN
Anemia sintomática por enfermedad renal crónica y por quimioterapia

PRESENTACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Jeringa de 30,000 UI · Vía subcutánea

CONSERVACIÓN
CADENA DE FRÍO: refrigerado 2–8 °C, no congelar

MECANISMO DE ACCIÓN
Eritropoyetina recombinante que estimula la proliferación de precursores eritroides

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Objetivo de hemoglobina 10-12 g/dL; corregir ferropenia antes de iniciar

APLICACIÓN O NIVEL DE ATENCIÓN
Ambulatorio · aplicación por personal de salud

COTIZAR AHORA

Whatsapp 5545546566

Mircera



Jeringa de 75 mcg / 0.3 mL

Metoxipolietilenglicol-epoetina beta ROCHE

INDICACIÓN
Anemia sintomática asociada a enfermedad renal crónica

PRESENTACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Jeringa de 75 mcg / 0.3 mL · Vía subcutánea

CONSERVACIÓN
CADENA DE FRÍO: refrigerado 2–8 °C, no congelar

MECANISMO DE ACCIÓN
Activador continuo del receptor de eritropoyetina, de vida media prolongada

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Aplicación mensual; no usar para anemia por quimioterapia; vigilar presión arterial

APLICACIÓN O NIVEL DE ATENCIÓN
Ambulatorio · aplicación por personal de salud

COTIZAR AHORA

Whatsapp 5545546566

Renegy



Ámpula de 500 mg

Carboximaltosa férrica TAKEDA

INDICACIÓN
Anemia por deficiencia de hierro cuando la vía oral es inefectiva o mal tolerada

PRESENTACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Ámpula de 500 mg · Vía intravenosa (infusión)

CONSERVACIÓN
Temperatura ambiente (15–25 °C), proteger de la luz

MECANISMO DE ACCIÓN
Complejo de hierro férrico estable que permite reposición rápida en dosis única alta

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Vigilar hipofosfatemia y reacciones de hipersensibilidad; observar 30 minutos tras la infusión

APLICACIÓN O NIVEL DE ATENCIÓN
Ambulatorio · aplicación por personal de salud

COTIZAR AHORA

Whatsapp 5545546566



Afinitor

Caja con 30 tabletas de 5 mg

Everolimus NOVARTIS

INDICACIÓN
Carcinoma renal, tumores neuroendocrinos, cáncer de mama HR+ y astrocitoma subependimario

PRESENTACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Caja con 30 tabletas de 5 mg · Vía oral

CONSERVACIÓN
Temperatura ambiente (15–25 °C), proteger de la luz

MECANISMO DE ACCIÓN
Inhibidor de mTOR; bloquea la señalización PI3K/AKT/mTOR

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Estomatitis, neumonitis no infecciosa e hiperglucemia; vigilar perfil metabólico

APLICACIÓN O NIVEL DE ATENCIÓN
Ambulatorio · el paciente puede autoadministrarlo con capacitación

COTIZAR AHORA

Whatsapp 5545546566



Aptimetyx

Caja con 30 tabletas de 60 mg

Cabozantinib IPSEN

INDICACIÓN
Carcinoma de células renales, hepatocarcinoma y cáncer medular de tiroides

PRESENTACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Caja con 30 tabletas de 60 mg · Vía oral

CONSERVACIÓN
Temperatura ambiente (15–25 °C), proteger de la luz

MECANISMO DE ACCIÓN
Inhibidor multicinasa de MET, VEGFR2, AXL y RET

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Tomar en ayuno; riesgo de perforación, fístula y hemorragia; hipertensión frecuente

APLICACIÓN O NIVEL DE ATENCIÓN
Ambulatorio · el paciente puede autoadministrarlo con capacitación

COTIZAR AHORA

Whatsapp 5545546566



Inlyta

Caja con 60 tabletas de 5 mg

Axitinib PFIZER

INDICACIÓN
Carcinoma de células renales avanzado, en combinación con inmunoterapia o en segunda línea

PRESENTACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Caja con 60 tabletas de 5 mg · Vía oral

CONSERVACIÓN
Temperatura ambiente (15–25 °C), proteger de la luz

MECANISMO DE ACCIÓN
Inhibidor potente y selectivo de VEGFR-1, 2 y 3

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Hipertensión de aparición temprana; vigilar proteinuria y función tiroidea

APLICACIÓN O NIVEL DE ATENCIÓN
Ambulatorio · el paciente puede autoadministrarlo con capacitación

COTIZAR AHORA

Whatsapp 5545546566



Sutent

Caja con 28 cápsulas de 50 mg

Sunitinib PFIZER

INDICACIÓN
Carcinoma de células renales, GIST tras imatinib y tumores neuroendocrinos pancreáticos

PRESENTACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Caja con 28 cápsulas de 50 mg · Vía oral

CONSERVACIÓN
Temperatura ambiente (15–25 °C), proteger de la luz

MECANISMO DE ACCIÓN
Inhibidor multicinasa de VEGFR, PDGFR, KIT y FLT3

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Hipotiroidismo, hipertensión y cardiotoxicidad; vigilar TSH y FEVI

APLICACIÓN O NIVEL DE ATENCIÓN
Ambulatorio · el paciente puede autoadministrarlo con capacitación

COTIZAR AHORA

Whatsapp 5545546566



Votrient

Caja con 60 tabletas de 400 mg

Pazopanib GLAXOSMITHKLINE

INDICACIÓN
Carcinoma de células renales avanzado y sarcoma de tejidos blandos

PRESENTACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Caja con 60 tabletas de 400 mg · Vía oral

CONSERVACIÓN
Temperatura ambiente (15–25 °C), proteger de la luz

MECANISMO DE ACCIÓN
Inhibidor multicinasa de VEGFR, PDGFR y c-KIT

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Hepatotoxicidad grave: transaminasas cada 2 semanas los primeros 2 meses; tomar en ayuno

APLICACIÓN O NIVEL DE ATENCIÓN
Ambulatorio · el paciente puede autoadministrarlo con capacitación

COTIZAR AHORA

Whatsapp 5545546566



Cyramza

Ámpula de 100 mg / 10 mL

Ramucirumab ELI LILLY

INDICACIÓN
Cáncer gástrico, CPCNP, colorrectal y hepatocarcinoma, en segunda línea

PRESENTACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Ámpula de 100 mg / 10 mL · Vía intravenosa (infusión)

CONSERVACIÓN
CADENA DE FRÍO: refrigerado 2–8 °C, no congelar

MECANISMO DE ACCIÓN
Anticuerpo monoclonal anti-VEGFR-2; bloquea la angiogénesis

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Hipertensión, hemorragia y alteración de la cicatrización; suspender antes de cirugía

APLICACIÓN O NIVEL DE ATENCIÓN
Hospitalario · centro de infusión o unidad especializada

COTIZAR AHORA

Whatsapp 5545546566



Lenvixi

Caja con 30 cápsulas de 10 mg

Lenvatinib EISAI

INDICACIÓN
Cáncer de tiroides refractario a yodo, hepatocarcinoma y carcinoma renal

PRESENTACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Caja con 30 cápsulas de 10 mg · Vía oral

CONSERVACIÓN
Temperatura ambiente (15–25 °C), proteger de la luz

MECANISMO DE ACCIÓN
Inhibidor multicinasa de VEGFR 1-3, FGFR 1-4, PDGFR-alfa, RET y KIT

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Hipertensión en las primeras semanas; vigilar proteinuria y función tiroidea

APLICACIÓN O NIVEL DE ATENCIÓN
Ambulatorio · el paciente puede autoadministrarlo con capacitación

COTIZAR AHORA

Whatsapp 5545546566



Nexavar

Caja con 112 comprimidos de 200 mg

Sorafenib BAYER

INDICACIÓN
Hepatocarcinoma avanzado, carcinoma renal y cáncer de tiroides refractario a yodo

PRESENTACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Caja con 112 comprimidos de 200 mg · Vía oral

CONSERVACIÓN
Temperatura ambiente (15–25 °C), proteger de la luz

MECANISMO DE ACCIÓN
Inhibidor multicinasa de RAF, VEGFR y PDGFR

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Síndrome mano-pie intenso; tomar en ayuno; vigilar presión arterial

APLICACIÓN O NIVEL DE ATENCIÓN
Ambulatorio · el paciente puede autoadministrarlo con capacitación

COTIZAR AHORA

Whatsapp 5545546566



Sortec

Caja con 112 comprimidos de 200 mg

Sorafenib ULSA TECH

INDICACIÓN
Hepatocarcinoma avanzado, carcinoma renal y cáncer de tiroides refractario a yodo

PRESENTACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Caja con 112 comprimidos de 200 mg · Vía oral

CONSERVACIÓN
Temperatura ambiente (15–25 °C), proteger de la luz

MECANISMO DE ACCIÓN
Inhibidor multicinasa de RAF, VEGFR y PDGFR

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Síndrome mano-pie intenso; tomar en ayuno; vigilar presión arterial

APLICACIÓN O NIVEL DE ATENCIÓN
Ambulatorio · el paciente puede autoadministrarlo con capacitación

COTIZAR AHORA

Whatsapp 5545546566



Zuclodox DRS

Ámpula de 20 mg / 10 mL

Doxorrubicina liposomal ZURICH PHARMA

INDICACIÓN
Sarcoma de Kaposi, cáncer de ovario y mieloma múltiple

PRESENTACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Ámpula de 20 mg / 10 mL · Vía intravenosa (infusión)

CONSERVACIÓN
CADENA DE FRÍO: refrigerado 2–8 °C, no congelar

MECANISMO DE ACCIÓN
Antraciclina encapsulada en liposomas pegilados con liberación tumoral preferente

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Menor cardiotoxicidad pero mayor síndrome mano-pie; no intercambiar con doxorrubicina convencional

APLICACIÓN O NIVEL DE ATENCIÓN
Hospitalario · centro de infusión o unidad especializada

COTIZAR AHORA

Whatsapp 5545546566



Avastin

Ámpula de 100 mg / 4 mL

Bevacizumab ROCHE

INDICACIÓN
Cáncer colorrectal, pulmón, ovario, cérvix, renal y glioblastoma recurrente

PRESENTACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Ámpula de 100 mg / 4 mL · Vía intravenosa (infusión)

CONSERVACIÓN
CADENA DE FRÍO: refrigerado 2–8 °C, no congelar

MECANISMO DE ACCIÓN
Anticuerpo monoclonal anti-VEGF-A; inhibe la angiogénesis tumoral

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Riesgo de perforación intestinal, hemorragia y dehiscencia de herida: suspender 28 días antes de cirugía

APLICACIÓN O NIVEL DE ATENCIÓN
Hospitalario · centro de infusión o unidad especializada

COTIZAR AHORA

Whatsapp 5545546566



Erbitux

Ámpula de 100 mg / 20 mL

Cetuximab MERCK

INDICACIÓN
Cáncer colorrectal metastásico RAS nativo y carcinoma epidermoide de cabeza y cuello

PRESENTACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Ámpula de 100 mg / 20 mL · Vía intravenosa (infusión)

CONSERVACIÓN
CADENA DE FRÍO: refrigerado 2–8 °C, no congelar

MECANISMO DE ACCIÓN
Anticuerpo monoclonal quimérico anti-EGFR; bloquea la señalización de proliferación

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Obligatorio determinar RAS antes de iniciar; rash acneiforme e hipomagnesemia

APLICACIÓN O NIVEL DE ATENCIÓN
Hospitalario · centro de infusión o unidad especializada

COTIZAR AHORA

Whatsapp 5545546566



Recoplat

Ámpula de 100 mg / 20 mL

Oxaliplatino ACCORD FARMA

INDICACIÓN
Cáncer colorrectal y gástrico, en esquemas FOLFOX, CAPOX y FLOT

PRESENTACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Ámpula de 100 mg / 20 mL · Vía intravenosa (infusión)

CONSERVACIÓN
Temperatura ambiente (15–25 °C), proteger de la luz

MECANISMO DE ACCIÓN
Compuesto de platino que forma aductos de ADN y bloquea la replicación

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Neuropatía sensitiva acumulativa agravada por el frío; evitar bebidas y objetos fríos

APLICACIÓN O NIVEL DE ATENCIÓN
Hospitalario · centro de infusión o unidad especializada

COTIZAR AHORA

Whatsapp 5545546566



Stivarga

Caja con 28 tabletas de 40 mg

Regorafenib BAYER

INDICACIÓN
Cáncer colorrectal metastásico, GIST y hepatocarcinoma tras líneas previas

PRESENTACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Caja con 28 tabletas de 40 mg · Vía oral

CONSERVACIÓN
Temperatura ambiente (15–25 °C), proteger de la luz

MECANISMO DE ACCIÓN
Inhibidor multicinasa de angiogénesis, oncogénesis y microambiente tumoral

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Hepatotoxicidad y síndrome mano-pie intensos; tomar con desayuno bajo en grasa

APLICACIÓN O NIVEL DE ATENCIÓN
Ambulatorio · el paciente puede autoadministrarlo con capacitación

COTIZAR AHORA

Whatsapp 5545546566



Xaniba

Caja con 120 tabletas de 500 mg

Capecitabina HETERO

INDICACIÓN
Cáncer colorrectal, gástrico y de mama, en monoterapia o combinación

PRESENTACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Caja con 120 tabletas de 500 mg · Vía oral

CONSERVACIÓN
Temperatura ambiente (15–25 °C), proteger de la luz

MECANISMO DE ACCIÓN
Profármaco oral de fluorouracilo activado por timidina fosforilasa en el tumor

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Síndrome mano-pie y diarrea; contraindicada en deficiencia de DPD; interacción con warfarina

APLICACIÓN O NIVEL DE ATENCIÓN
Ambulatorio · el paciente puede autoadministrarlo con capacitación

COTIZAR AHORA

Whatsapp 5545546566



Jemperli

Frasco de 500 mg / 10 mL

Dostarlimab GLAXOSMITHKLINE

INDICACIÓN
Cáncer de endometrio recurrente o avanzado con deficiencia de reparación (dMMR/MSI-H)

PRESENTACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Frasco de 500 mg / 10 mL · Vía intravenosa (infusión)

CONSERVACIÓN
CADENA DE FRÍO: refrigerado 2–8 °C, no congelar

MECANISMO DE ACCIÓN
Anticuerpo monoclonal anti-PD-1; restablece la respuesta inmune antitumoral

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Requiere confirmar estado dMMR/MSI-H; eventos adversos inmunomediados

APLICACIÓN O NIVEL DE ATENCIÓN
Hospitalario · centro de infusión o unidad especializada

COTIZAR AHORA

Whatsapp 5545546566



Enhertu

Frasco de 100 mg

Trastuzumab Deruxtecan ASTRAZENECA

INDICACIÓN
Cáncer de mama HER2+ y HER2-bajo, gástrico y CPCNP HER2 mutado

PRESENTACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Frasco de 100 mg · Vía intravenosa (infusión)

CONSERVACIÓN
CADENA DE FRÍO: refrigerado 2–8 °C, no congelar

MECANISMO DE ACCIÓN
Anticuerpo conjugado anti-HER2 unido a un inhibidor de topoisomerasa I

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Enfermedad pulmonar intersticial potencialmente mortal: vigilar tos, disnea y TAC

APLICACIÓN O NIVEL DE ATENCIÓN
Hospitalario · centro de infusión o unidad especializada

COTIZAR AHORA

Whatsapp 5545546566



Kadcyla

Ámpula de 160 mg / 8 mL

Trastuzumab Emtansina ROCHE

INDICACIÓN
Cáncer de mama HER2+ con enfermedad residual tras neoadyuvancia o metastásico

PRESENTACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Ámpula de 160 mg / 8 mL · Vía intravenosa (infusión)

CONSERVACIÓN
CADENA DE FRÍO: refrigerado 2–8 °C, no congelar

MECANISMO DE ACCIÓN
Anticuerpo conjugado anti-HER2 unido al agente antimicrotúbulo DM1

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Hepatotoxicidad y trombocitopenia; no confundir ni intercambiar con trastuzumab simple

APLICACIÓN O NIVEL DE ATENCIÓN
Hospitalario · centro de infusión o unidad especializada

COTIZAR AHORA

Whatsapp 5545546566



Perjeta

Ámpula de 420 mg / 14 mL

Pertuzumab ROCHE

INDICACIÓN
Cáncer de mama HER2+ neoadyuvante, adyuvante y metastásico, con trastuzumab

PRESENTACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Ámpula de 420 mg / 14 mL · Vía intravenosa (infusión)

CONSERVACIÓN
CADENA DE FRÍO: refrigerado 2–8 °C, no congelar


MECANISMO DE ACCIÓN
Anticuerpo monoclonal que bloquea la dimerización de HER2 con HER3

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Vigilar FEVI cada 3 meses; no usar durante el embarazo por oligohidramnios

APLICACIÓN O NIVEL DE ATENCIÓN
Hospitalario · centro de infusión o unidad especializada

COTIZAR AHORA

Whatsapp 5545546566



Trazimera

Ámpula de 440 mg con ámpula de diluyente

Trastuzumab PFIZER

INDICACIÓN
Cáncer de mama HER2+ adyuvante y metastásico, y cáncer gástrico HER2+

PRESENTACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Ámpula de 440 mg con ámpula de diluyente · Vía intravenosa (infusión)

CONSERVACIÓN
CADENA DE FRÍO: refrigerado 2–8 °C, no congelar

MECANISMO DE ACCIÓN
Anticuerpo monoclonal anti-HER2; inhibe la señalización y activa ADCC

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Cardiotoxicidad reversible: FEVI basal y cada 3 meses; no combinar con antraciclinas

APLICACIÓN O NIVEL DE ATENCIÓN
Hospitalario · centro de infusión o unidad especializada

COTIZAR AHORA

Whatsapp 5545546566



Tykerb

Caja con 70 tabletas de 250 mg

Lapatinib GLAXOSMITHKLINE

INDICACIÓN
Cáncer de mama HER2+ avanzado, con capecitabina o inhibidor de aromatasa

PRESENTACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Caja con 70 tabletas de 250 mg · Vía oral

CONSERVACIÓN
Temperatura ambiente (15–25 °C), proteger de la luz

MECANISMO DE ACCIÓN
Inhibidor dual reversible de las tirosina cinasas HER2 y EGFR

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Tomar en ayuno; hepatotoxicidad y diarrea; vigilar FEVI y transaminasas

APLICACIÓN O NIVEL DE ATENCIÓN
Ambulatorio · el paciente puede autoadministrarlo con capacitación

COTIZAR AHORA

Whatsapp 5545546566

Arimidex



Caja con 28 tabletas de 1 mg

Anastrozol ASTRAZENECA

INDICACIÓN
Cáncer de mama HR+ en mujer posmenopáusica, adyuvancia y enfermedad avanzada

PRESENTACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Caja con 28 tabletas de 1 mg · Vía oral

CONSERVACIÓN
Temperatura ambiente (15–25 °C), proteger de la luz

MECANISMO DE ACCIÓN
Inhibidor no esteroideo de la aromatasa; suprime la conversión periférica de andrógenos a estrógenos

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Pérdida de densidad mineral ósea y artralgias; vigilar densitometría y perfil lipídico

APLICACIÓN O NIVEL DE ATENCIÓN
Ambulatorio · el paciente puede autoadministrarlo con capacitación

COTIZAR AHORA

Whatsapp 5545546566

Ibrance



Caja con 21 cápsulas de 125 mg

Palbociclib PFIZER

INDICACIÓN
Cáncer de mama HR+/HER2− avanzado, con inhibidor de aromatasa o fulvestrant

PRESENTACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Caja con 21 cápsulas de 125 mg · Vía oral

CONSERVACIÓN
Temperatura ambiente (15–25 °C), proteger de la luz

MECANISMO DE ACCIÓN
Inhibidor selectivo de CDK4/6 que impide la transición G1-S del ciclo celular

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Neutropenia en la mayoría de pacientes: biometría antes de cada ciclo y al día 15

APLICACIÓN O NIVEL DE ATENCIÓN
Ambulatorio · el paciente puede autoadministrarlo con capacitación

COTIZAR AHORA

Whatsapp 5545546566

Kisqali



Caja con 63 tabletas de 200 mg

Ribociclib NOVARTIS

INDICACIÓN
Cáncer de mama HR+/HER2− avanzado, con hormonoterapia

PRESENTACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Caja con 63 tabletas de 200 mg · Vía oral

CONSERVACIÓN
Temperatura ambiente (15–25 °C), proteger de la luz

MECANISMO DE ACCIÓN
Inhibidor selectivo de CDK4/6

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Prolongación del QT: ECG y electrolitos basales, día 14 y ciclo 2; vigilar transaminasas

APLICACIÓN O NIVEL DE ATENCIÓN
Ambulatorio · el paciente puede autoadministrarlo con capacitación

COTIZAR AHORA

Whatsapp 5545546566

Piqray

Caja con 56 comprimidos de 150 mg



Alpelisib NOVARTIS

INDICACIÓN
Cáncer de mama HR+/HER2− avanzado con mutación PIK3CA, con fulvestrant

MECANISMO DE ACCIÓN
Inhibidor selectivo de la subunidad alfa de PI3K

PRESENTACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Caja con 56 comprimidos de 150 mg · Vía oral

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Hiperglucemia frecuente y grave; medir HbA1c y glucosa basal antes de iniciar

CONSERVACIÓN
Temperatura ambiente (15–25 °C), proteger de la luz

APLICACIÓN O NIVEL DE ATENCIÓN
Ambulatorio · el paciente puede autoadministrarlo con capacitación

COTIZAR AHORA

Whatsapp 5545546566

Verzenio

Caja con 56 tabletas de 150 mg



Abemaciclib ELI LILLY

INDICACIÓN
Cáncer de mama HR+/HER2− avanzado y adyuvancia de alto riesgo, con hormonoterapia

MECANISMO DE ACCIÓN
Inhibidor de las cinasas dependientes de ciclina 4 y 6 (CDK4/6); detiene el ciclo en G1

PRESENTACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Caja con 56 tabletas de 150 mg · Vía oral

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Diarrea frecuente desde el primer ciclo; vigilar neutropenia y riesgo de tromboembolismo

CONSERVACIÓN
Temperatura ambiente (15–25 °C), proteger de la luz

APLICACIÓN O NIVEL DE ATENCIÓN
Ambulatorio · el paciente puede autoadministrarlo con capacitación

COTIZAR AHORA

Whatsapp 5545546566



Acoexcel

Ámpula de 300 mg / 50 mL

Paclitaxel ACCORD FARMA

INDICACIÓN
Cáncer de mama, ovario, pulmón, cabeza y cuello y sarcoma de Kaposi

PRESENTACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Ámpula de 300 mg / 50 mL · Vía intravenosa (infusión)

CONSERVACIÓN
Temperatura ambiente (15–25 °C), proteger de la luz

MECANISMO DE ACCIÓN
Taxano que estabiliza los microtúbulos y bloquea la mitosis

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Premedicación obligatoria con corticoide y antihistamínico; usar filtro y equipo libre de PVC

APLICACIÓN O NIVEL DE ATENCIÓN
Hospitalario · centro de infusión o unidad especializada

COTIZAR AHORA

Whatsapp 5545546566



Camtoop

Ámpula de 4 mg / 4 mL

Topotecán ACCORD FARMA

INDICACIÓN
Cáncer de ovario platino-resistente, cáncer de pulmón de células pequeñas y cérvix

PRESENTACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Ámpula de 4 mg / 4 mL · Vía intravenosa (infusión)

CONSERVACIÓN
Temperatura ambiente (15–25 °C), proteger de la luz

MECANISMO DE ACCIÓN
Inhibidor de la topoisomerasa I

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Mielosupresión grave dosis-limitante; requiere biometría antes de cada ciclo

APLICACIÓN O NIVEL DE ATENCIÓN
Hospitalario · centro de infusión o unidad especializada

COTIZAR AHORA

Whatsapp 5545546566



Lynparza

Caja con 56 tabletas de 150 mg

Olaparib ASTRAZENECA

INDICACIÓN
Cáncer de ovario, mama, próstata y páncreas con mutación BRCA

PRESENTACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Caja con 56 tabletas de 150 mg · Vía oral

CONSERVACIÓN
Temperatura ambiente (15–25 °C), proteger de la luz

MECANISMO DE ACCIÓN
Inhibidor de PARP; produce letalidad sintética en células con déficit de recombinación homóloga

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Requiere prueba de BRCA; vigilar anemia y riesgo de SMD/LMA secundaria

APLICACIÓN O NIVEL DE ATENCIÓN
Ambulatorio · el paciente puede autoadministrarlo con capacitación

COTIZAR AHORA

Whatsapp 5545546566



Nuvaplast

Ámpula de 450 mg / 45 mL

Carboplatino ACCORD FARMA

INDICACIÓN
Cáncer de ovario, pulmón, endometrio, cabeza y cuello y testicular

PRESENTACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Ámpula de 450 mg / 45 mL · Vía intravenosa (infusión)

CONSERVACIÓN
Temperatura ambiente (15–25 °C), proteger de la luz

MECANISMO DE ACCIÓN
Agente alquilante de platino; forma aductos de ADN que bloquean la replicación

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Dosificar por AUC con fórmula de Calvert; mielosupresión, sobre todo trombocitopenia

APLICACIÓN O NIVEL DE ATENCIÓN
Hospitalario · centro de infusión o unidad especializada

COTIZAR AHORA

Whatsapp 5545546566



Zejula

Caja con 90 cápsulas de 100 mg

Niraparib GLAXOSMITHKLINE

INDICACIÓN
Mantenimiento en cáncer de ovario avanzado tras respuesta a platino

PRESENTACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Caja con 90 cápsulas de 100 mg · Vía oral

CONSERVACIÓN
Temperatura ambiente (15–25 °C), proteger de la luz

MECANISMO DE ACCIÓN
Inhibidor de PARP-1 y PARP-2; letalidad sintética en tumores con daño de recombinación

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Trombocitopenia dosis-dependiente: biometría semanal el primer mes

APLICACIÓN O NIVEL DE ATENCIÓN
Ambulatorio · el paciente puede autoadministrarlo con capacitación

COTIZAR AHORA

Whatsapp 5545546566



Eligard

Jeringa prellenada de 45 mg (depósito semestral)

Leuprorelina ASOFARMA

INDICACIÓN
Cáncer de próstata hormonosensible, endometriosis y miomatosis uterina

PRESENTACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Jeringa prellenada de 45 mg (depósito semestral) · Vía subcutánea

CONSERVACIÓN
CADENA DE FRÍO: refrigerado 2–8 °C, no congelar

MECANISMO DE ACCIÓN
Agonista de GnRH que produce castración química por desensibilización hipofisaria

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Fenómeno de llamarada inicial: asociar antiandrógeno las primeras semanas

APLICACIÓN O NIVEL DE ATENCIÓN
Ambulatorio · aplicación por personal de salud

COTIZAR AHORA

Whatsapp 5545546566



Erleada

Caja con 120 tabletas de 60 mg

Apalutamida JANSSEN

INDICACIÓN
Cáncer de próstata no metastásico resistente a castración y metastásico hormonosensible

PRESENTACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Caja con 120 tabletas de 60 mg · Vía oral

CONSERVACIÓN
Temperatura ambiente (15–25 °C), proteger de la luz

MECANISMO DE ACCIÓN
Antagonista competitivo del receptor de andrógenos de segunda generación

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Riesgo de caídas, fracturas y exantema; múltiples interacciones por inducción del CYP

APLICACIÓN O NIVEL DE ATENCIÓN
Ambulatorio · el paciente puede autoadministrarlo con capacitación

COTIZAR AHORA

Whatsapp 5545546566



Nubeqal

Caja con 120 tabletas de 300 mg

Darolutamida BAYER

INDICACIÓN
Cáncer de próstata no metastásico resistente a castración y metastásico hormonosensible

PRESENTACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Caja con 120 tabletas de 300 mg · Vía oral

CONSERVACIÓN
Temperatura ambiente (15–25 °C), proteger de la luz

MECANISMO DE ACCIÓN
Antagonista del receptor de andrógenos con mínima penetración a sistema nervioso central

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Perfil neurológico más favorable; vigilar fatiga y transaminasas

APLICACIÓN O NIVEL DE ATENCIÓN
Ambulatorio · el paciente puede autoadministrarlo con capacitación

COTIZAR AHORA

Whatsapp 5545546566



Xtandi

Caja con 120 cápsulas de 40 mg

Enzalutamida ASTELLAS

INDICACIÓN
Cáncer de próstata resistente a castración y metastásico hormonosensible

PRESENTACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Caja con 120 cápsulas de 40 mg · Vía oral

CONSERVACIÓN
Temperatura ambiente (15–25 °C), proteger de la luz

MECANISMO DE ACCIÓN
Antagonista del receptor de andrógenos que bloquea unión, translocación nuclear y transcripción

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Riesgo de convulsiones; evitar en antecedente convulsivo; fatiga y caídas frecuentes

APLICACIÓN O NIVEL DE ATENCIÓN
Ambulatorio · el paciente puede autoadministrarlo con capacitación

COTIZAR AHORA

Whatsapp 5545546566



Zytiga

Caja con 120 tabletas de 250 mg

Abiraterona JANSSEN

INDICACIÓN
Cáncer de próstata metastásico sensible y resistente a castración, con prednisona

PRESENTACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Caja con 120 tabletas de 250 mg · Vía oral

CONSERVACIÓN
Temperatura ambiente (15–25 °C), proteger de la luz

MECANISMO DE ACCIÓN
Inhibidor de CYP17A1; bloquea la síntesis de andrógenos testicular, suprarrenal y tumoral

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Requiere prednisona concomitante; vigilar hipertensión, hipokalemia y transaminasas

APLICACIÓN O NIVEL DE ATENCIÓN
Ambulatorio · el paciente puede autoadministrarlo con capacitación

COTIZAR AHORA

Whatsapp 5545546566



Alimta

Ámpula de 500 mg

Pemetrexed ELI LILLY

INDICACIÓN
CPCNP no escamoso y mesotelioma pleural maligno

PRESENTACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Ámpula de 500 mg · Vía intravenosa (infusión)

CONSERVACIÓN
Temperatura ambiente (15–25 °C), proteger de la luz

MECANISMO DE ACCIÓN
Antifolato multidiana que inhibe timidilato sintasa, DHFR y GARFT

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Obligatorio suplementar ácido fólico y vitamina B12 antes y durante el tratamiento

APLICACIÓN O NIVEL DE ATENCIÓN
Hospitalario · centro de infusión o unidad especializada

COTIZAR AHORA

Whatsapp 5545546566



IMJUDO

Frasco de 300 mg / 15 mL

Tremelimumab ASTRAZENECA

INDICACIÓN
Hepatocarcinoma y CPCNP metastásico, en combinación con durvalumab

PRESENTACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Frasco de 300 mg / 15 mL · Vía intravenosa (infusión)

CONSERVACIÓN
CADENA DE FRÍO: refrigerado 2–8 °C, no congelar

MECANISMO DE ACCIÓN
Anticuerpo monoclonal anti-CTLA-4

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Alta frecuencia de toxicidad inmunomediada grave; protocolo institucional de manejo

APLICACIÓN O NIVEL DE ATENCIÓN
Hospitalario · centro de infusión o unidad especializada

COTIZAR AHORA

Whatsapp 5545546566



Imfinzio

Frasco de 500 mg

Durvalumab ASTRAZENECA

INDICACIÓN
CPCNP estadio III irresecable tras quimiorradioterapia y cáncer de pulmón de células pequeñas

PRESENTACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Frasco de 500 mg · Vía intravenosa (infusión)

CONSERVACIÓN
CADENA DE FRÍO: refrigerado 2–8 °C, no congelar

MECANISMO DE ACCIÓN
Anticuerpo monoclonal anti-PD-L1

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Neumonitis inmunomediada, especialmente tras radioterapia torácica

APLICACIÓN O NIVEL DE ATENCIÓN
Hospitalario · centro de infusión o unidad especializada

COTIZAR AHORA

Whatsapp 5545546566



Tecentriq

Ámpula de 1200 mg / 20 mL

Atezolizumab ROCHE

INDICACIÓN
CPCNP, cáncer de pulmón de células pequeñas, hepatocarcinoma y urotelial

PRESENTACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Ámpula de 1200 mg / 20 mL · Vía intravenosa (infusión)

CONSERVACIÓN
CADENA DE FRÍO: refrigerado 2–8 °C, no congelar

MECANISMO DE ACCIÓN
Anticuerpo monoclonal anti-PD-L1; restaura la respuesta citotóxica antitumoral

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Eventos adversos inmunomediados: neumonitis, colitis, hepatitis y endocrinopatías

APLICACIÓN O NIVEL DE ATENCIÓN
Hospitalario · centro de infusión o unidad especializada

COTIZAR AHORA

Whatsapp 5545546566



Vargatef

Caja con 120 cápsulas de 100 mg

Nintedanib BOEHRINGER INGELHEIM

INDICACIÓN
Fibrosis pulmonar idiopática, enfermedad intersticial progresiva y CPCNP

PRESENTACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Caja con 120 cápsulas de 100 mg · Vía oral

CONSERVACIÓN
Temperatura ambiente (15–25 °C), proteger de la luz

MECANISMO DE ACCIÓN
Inhibidor de tirosina cinasas de VEGFR, FGFR y PDGFR con efecto antifibrótico

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Diarrea muy frecuente; vigilar transaminasas y riesgo hemorrágico

APLICACIÓN O NIVEL DE ATENCIÓN
Ambulatorio · el paciente puede autoadministrarlo con capacitación

COTIZAR AHORA

Whatsapp 5545546566



Giotrif

Caja con 30 tabletas de 40 mg

Afatinib BOEHRINGER INGELHEIM

INDICACIÓN
CPCNP avanzado con mutaciones activadoras de EGFR, primera línea

PRESENTACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Caja con 30 tabletas de 40 mg · Vía oral

CONSERVACIÓN
Temperatura ambiente (15–25 °C), proteger de la luz

MECANISMO DE ACCIÓN
Inhibidor irreversible de la familia ErbB (EGFR, HER2, HER4)

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Diarrea y rash acneiforme muy frecuentes; ajustar dosis y tratar de forma temprana

APLICACIÓN O NIVEL DE ATENCIÓN
Ambulatorio · el paciente puede autoadministrarlo con capacitación

COTIZAR AHORA

Whatsapp 5545546566



Iressa

Caja con 30 tabletas de 250 mg

Gefitinib ASTRAZENECA

INDICACIÓN
CPCNP avanzado con mutación activadora de EGFR, primera línea

PRESENTACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Caja con 30 tabletas de 250 mg · Vía oral

CONSERVACIÓN
Temperatura ambiente (15–25 °C), proteger de la luz

MECANISMO DE ACCIÓN
Inhibidor reversible de la tirosina cinasa del EGFR de primera generación

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Enfermedad pulmonar intersticial poco frecuente pero grave; suspender ante disnea nueva

APLICACIÓN O NIVEL DE ATENCIÓN
Ambulatorio · el paciente puede autoadministrarlo con capacitación

COTIZAR AHORA

Whatsapp 5545546566



Lorbrena

Caja con 30 tabletas de 100 mg

Lorlatinib PFIZER

INDICACIÓN
CPCNP ALK positivo tras falla a inhibidores de ALK previos, incluida enfermedad cerebral

PRESENTACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Caja con 30 tabletas de 100 mg · Vía oral

CONSERVACIÓN
Temperatura ambiente (15–25 °C), proteger de la luz

MECANISMO DE ACCIÓN
Inhibidor de ALK y ROS1 de tercera generación con alta penetración al sistema nervioso central

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Efectos cognitivos y del estado de ánimo; hipercolesterolemia casi universal

APLICACIÓN O NIVEL DE ATENCIÓN
Ambulatorio · el paciente puede autoadministrarlo con capacitación

COTIZAR AHORA

Whatsapp 5545546566

Cáncer de pulmón CPCNP con mutación (EGFR / ALK)



Tagrisso

Caja con 30 tabletas de 80 mg

Osimertinib ASTRAZENECA

INDICACIÓN
CPCNP con mutación EGFR, primera línea, resistencia T790M y adyuvancia

PRESENTACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Caja con 30 tabletas de 80 mg · Vía oral

CONSERVACIÓN
Temperatura ambiente (15–25 °C), proteger de la luz

MECANISMO DE ACCIÓN
Inhibidor irreversible de EGFR de tercera generación con actividad intracraneal

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Vigilar FEVI, QT y enfermedad pulmonar intersticial; suspender ante disnea nueva

APLICACIÓN O NIVEL DE ATENCIÓN
Ambulatorio · el paciente puede autoadministrarlo con capacitación

COTIZAR AHORA

Whatsapp 5545546566



Xalkori

Caja con 60 cápsulas de 250 mg

Crizotinib PFIZER

INDICACIÓN
CPCNP avanzado con reordenamiento de ALK o ROS1

PRESENTACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Caja con 60 cápsulas de 250 mg · Vía oral

CONSERVACIÓN
Temperatura ambiente (15–25 °C), proteger de la luz

MECANISMO DE ACCIÓN
Inhibidor de las tirosina cinasas ALK, ROS1 y MET

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Alteraciones visuales, prolongación del QT y hepatotoxicidad; vigilar ECG y transaminasas

APLICACIÓN O NIVEL DE ATENCIÓN
Ambulatorio · el paciente puede autoadministrarlo con capacitación

COTIZAR AHORA

Whatsapp 5545546566



Abraxus

Ámpula de 100 mg

Paclitaxel unido a albúmina ABRAXIS BIOSCIENCE

INDICACIÓN
Cáncer de mama metastásico, páncreas (con gemcitabina) y CPCNP

PRESENTACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Ámpula de 100 mg · Vía intravenosa (infusión)

CONSERVACIÓN
Temperatura ambiente (15–25 °C), proteger de la luz

MECANISMO DE ACCIÓN
Nanopartículas de paclitaxel ligado a albúmina; mayor concentración intratumoral

ADVERTENCIA IMPORTANTE
No intercambiar con paclitaxel convencional; no requiere premedicación esteroidea

APLICACIÓN O NIVEL DE ATENCIÓN
Hospitalario · centro de infusión o unidad especializada

COTIZAR AHORA

Whatsapp 5545546566



Camptosar

Ámpula de 100 mg / 5 mL

Irinotecán PFIZER

INDICACIÓN
Cáncer colorrectal metastásico y de páncreas, en esquemas FOLFIRI y FOLFIRINOX

PRESENTACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Ámpula de 100 mg / 5 mL · Vía intravenosa (infusión)

CONSERVACIÓN
Temperatura ambiente (15–25 °C), proteger de la luz

MECANISMO DE ACCIÓN
Inhibidor de la topoisomerasa I; impide la replicación del ADN

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Diarrea temprana colinérgica y tardía grave; considerar genotipo UGT1A1

APLICACIÓN O NIVEL DE ATENCIÓN
Hospitalario · centro de infusión o unidad especializada

COTIZAR AHORA

Whatsapp 5545546566



Colizactive

Ámpula de 100 mg / 5 mL

Irinotecán NO ESPECIFICADO.

INDICACIÓN
Cáncer colorrectal metastásico y de páncreas, en esquemas FOLFIRI y FOLFIRINOX

PRESENTACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Ámpula de 100 mg / 5 mL · Vía intravenosa (infusión)

CONSERVACIÓN
Temperatura ambiente (15–25 °C), proteger de la luz

MECANISMO DE ACCIÓN
Inhibidor de la topoisomerasa I; impide la replicación del ADN

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Diarrea temprana colinérgica y tardía grave; considerar genotipo UGT1A1

APLICACIÓN O NIVEL DE ATENCIÓN
Hospitalario · centro de infusión o unidad especializada

COTIZAR AHORA

Whatsapp 5545546566



Kavya

Ámpula de 1,000 mg / 25 mL

Gemcitabina HETERO

INDICACIÓN
Cáncer de páncreas, vejiga, ovario, mama y CPCNP

PRESENTACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Ámpula de 1,000 mg / 25 mL · Vía intravenosa (infusión)

CONSERVACIÓN
Temperatura ambiente (15–25 °C), proteger de la luz


MECANISMO DE ACCIÓN
Análogo de nucleósido que inhibe la síntesis de ADN y la ribonucleótido reductasa

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Mielosupresión y síndrome pseudogripal; vigilar biometría antes de cada aplicación

APLICACIÓN O NIVEL DE ATENCIÓN
Hospitalario · centro de infusión o unidad especializada

COTIZAR AHORA

Whatsapp 5545546566



Nuvaplast

Ámpula de 150 mg / 15 mL

Carboplatino ACCORD FARMA

INDICACIÓN
Cáncer de ovario, pulmón, endometrio, cabeza y cuello y testicular

PRESENTACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Ámpula de 150 mg / 15 mL · Vía intravenosa (infusión)

CONSERVACIÓN
Temperatura ambiente (15–25 °C), proteger de la luz

MECANISMO DE ACCIÓN
Agente alquilante de platino; forma aductos de ADN que bloquean la replicación

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Dosificar por AUC con fórmula de Calvert; mielosupresión, sobre todo trombocitopenia

APLICACIÓN O NIVEL DE ATENCIÓN
Hospitalario · centro de infusión o unidad especializada

COTIZAR AHORA

Whatsapp 5545546566

Caprelsa

Caja con 30 tabletas de 300 mg

Vandetanib SANOFI



INDICACIÓN
Cáncer medular de tiroides sintomático, avanzado o metastásico

PRESENTACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Caja con 30 tabletas de 300 mg · Vía oral

CONSERVACIÓN
Temperatura ambiente (15–25 °C), proteger de la luz

MECANISMO DE ACCIÓN
Inhibidor de RET, VEGFR y EGFR

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Prolongación del QT y muerte súbita: ECG y electrolitos seriados obligatorios

APLICACIÓN O NIVEL DE ATENCIÓN
Ambulatorio · el paciente puede autoadministrarlo con capacitación

COTIZAR AHORA

Whatsapp 5545546566

Lenvixi

Caja con 30 cápsulas de 4 mg

Lenvatinib EISAI



INDICACIÓN
Cáncer de tiroides refractario a yodo, hepatocarcinoma y carcinoma renal

PRESENTACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Caja con 30 cápsulas de 4 mg · Vía oral

CONSERVACIÓN
Temperatura ambiente (15–25 °C), proteger de la luz

MECANISMO DE ACCIÓN
Inhibidor multicinasa de VEGFR 1-3, FGFR 1-4, PDGFR-alfa, RET y KIT

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Hipertensión en las primeras semanas; vigilar proteinuria y función tiroidea

APLICACIÓN O NIVEL DE ATENCIÓN
Ambulatorio · el paciente puede autoadministrarlo con capacitación

COTIZAR AHORA

Whatsapp 5545546566

Thyrogen

Caja con 2 frascos de 1.1 mg

Tirotropina alfa SANOFI GENZYME



INDICACIÓN
Estimulación de tiroglobulina y captación de yodo en seguimiento de cáncer de tiroides

PRESENTACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Caja con 2 frascos de 1.1 mg · Vía intramuscular

CONSERVACIÓN
CADENA DE FRÍO: refrigerado 2–8 °C, no congelar

MECANISMO DE ACCIÓN
TSH humana recombinante que estimula el tejido tiroideo residual

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Evita la suspensión de levotiroxina y el hipotiroidismo asociado; aplicación IM en 2 días

APLICACIÓN O NIVEL DE ATENCIÓN
Hospitalario · centro de infusión o unidad especializada

COTIZAR AHORA

Whatsapp 5545546566



Bavencio

Ámpula de 200 mg / 10 mL

Avelumab MERCK

INDICACIÓN
Mantenimiento en carcinoma urotelial avanzado y carcinoma de células de Merkel

PRESENTACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Ámpula de 200 mg / 10 mL · Vía intravenosa (infusión)

CONSERVACIÓN
CADENA DE FRÍO: refrigerado 2–8 °C, no congelar

MECANISMO DE ACCIÓN
Anticuerpo monoclonal anti-PD-L1 con actividad ADCC

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Premedicar las primeras infusiones por riesgo de reacción infusional

APLICACIÓN O NIVEL DE ATENCIÓN
Hospitalario · centro de infusión o unidad especializada

COTIZAR AHORA

Whatsapp 5545546566



Cultivo BCG

Caja con 4 frascos de 30 mg

BCG para instilación vesical TEVA

INDICACIÓN
Cáncer de vejiga no músculo-invasor de riesgo intermedio y alto, tras RTU

PRESENTACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Caja con 4 frascos de 30 mg · Instilación intravesical

CONSERVACIÓN
CADENA DE FRÍO: refrigerado 2–8 °C, no congelar

MECANISMO DE ACCIÓN
Inmunoterapia local: induce respuesta inflamatoria Th1 en la mucosa vesical

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Producto vivo atenuado; contraindicado en inmunosupresión y hematuria macroscópica

APLICACIÓN O NIVEL DE ATENCIÓN
Hospitalario · centro de infusión o unidad especializada

COTIZAR AHORA

Whatsapp 5545546566



Kenomix

Ámpula de 5 mg

Mitomicina NOVAG

INDICACIÓN
Instilación vesical en cáncer superficial de vejiga y tumores digestivos

PRESENTACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Ámpula de 5 mg · Instilación intravesical

CONSERVACIÓN
Temperatura ambiente (15–25 °C), proteger de la luz

MECANISMO DE ACCIÓN
Antibiótico antitumoral que alquila y entrecruza el ADN

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Vesicante; riesgo de síndrome urémico hemolítico y toxicidad pulmonar con uso prolongado

APLICACIÓN O NIVEL DE ATENCIÓN
Hospitalario · centro de infusión o unidad especializada

COTIZAR AHORA

Whatsapp 5545546566



Acoflut

Caja con 10 ámpulas de 250 mg / 5 mL

Fluorouracilo ACCORD FARMA

INDICACIÓN
Cáncer colorrectal, gástrico, de mama, páncreas y cabeza y cuello

PRESENTACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Caja con 10 ámpulas de 250 mg / 5 mL · Vía intravenosa (infusión)

CONSERVACIÓN
Temperatura ambiente (15–25 °C), proteger de la luz

MECANISMO DE ACCIÓN
Antimetabolito que inhibe la timidilato sintasa y bloquea la síntesis de ADN

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Contraindicado en deficiencia de DPD: riesgo de toxicidad grave o mortal

APLICACIÓN O NIVEL DE ATENCIÓN
Hospitalario · centro de infusión o unidad especializada

COTIZAR AHORA

Whatsapp 5545546566



Cyramza

Ámpula de 500 mg / 50 mL

Ramucirumab ELI LILLY

INDICACIÓN
Cáncer gástrico, CPCNP, colorrectal y hepatocarcinoma, en segunda línea

PRESENTACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Ámpula de 500 mg / 50 mL · Vía intravenosa (infusión)

CONSERVACIÓN
CADENA DE FRÍO: refrigerado 2–8 °C, no congelar

MECANISMO DE ACCIÓN
Anticuerpo monoclonal anti-VEGFR-2; bloquea la angiogénesis

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Hipertensión, hemorragia y alteración de la cicatrización; suspender antes de cirugía

APLICACIÓN O NIVEL DE ATENCIÓN
Hospitalario · centro de infusión o unidad especializada

COTIZAR AHORA

Whatsapp 5545546566



Miocerkel

Ámpula de 80 mg

Docetaxel ULSA TECH

INDICACIÓN
Cáncer de mama, próstata, pulmón, gástrico y de cabeza y cuello

PRESENTACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Ámpula de 80 mg · Vía intravenosa (infusión)

CONSERVACIÓN
Temperatura ambiente (15–25 °C), proteger de la luz

MECANISMO DE ACCIÓN
Taxano: estabiliza los microtúbulos e impide la mitosis

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Premedicación con corticoide obligatoria por retención hídrica e hipersensibilidad

APLICACIÓN O NIVEL DE ATENCIÓN
Hospitalario · centro de infusión o unidad especializada

COTIZAR AHORA

Whatsapp 5545546566



Recoplat

Ámpula de 50 mg / 10 mL

Oxaliplatino ACCORD FARMA

INDICACIÓN
Cáncer colorrectal y gástrico, en esquemas FOLFOX, CAPOX y FLOT

PRESENTACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Ámpula de 50 mg / 10 mL · Vía intravenosa (infusión)

CONSERVACIÓN
Temperatura ambiente (15–25 °C), proteger de la luz

MECANISMO DE ACCIÓN
Compuesto de platino que forma aductos de ADN y bloquea la replicación

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Neuropatía sensitiva acumulativa agravada por el frío; evitar bebidas y objetos fríos

APLICACIÓN O NIVEL DE ATENCIÓN
Hospitalario · centro de infusión o unidad especializada

COTIZAR AHORA

Whatsapp 5545546566



Skemca

Caja con 120 tabletas de 500 mg

Capecitabina ACCORD FARMA

INDICACIÓN
Cáncer colorrectal, gástrico y de mama, en monoterapia o combinación

PRESENTACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Caja con 120 tabletas de 500 mg · Vía oral

CONSERVACIÓN
Temperatura ambiente (15–25 °C), proteger de la luz

MECANISMO DE ACCIÓN
Profármaco oral de fluorouracilo activado por timidina fosforilasa en el tumor

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Síndrome mano-pie y diarrea; contraindicada en deficiencia de DPD; interacción con warfarina

APLICACIÓN O NIVEL DE ATENCIÓN
Ambulatorio · el paciente puede autoadministrarlo con capacitación

COTIZAR AHORA

Whatsapp 5545546566



Effivia

Frasco de 400 mg / 16 mL

Bevacizumab LIOMONT

INDICACIÓN
Cáncer colorrectal, pulmón, ovario, cérvix, renal y glioblastoma recurrente

PRESENTACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Frasco de 400 mg / 16 mL · Vía intravenosa (infusión)

CONSERVACIÓN
CADENA DE FRÍO: refrigerado 2–8 °C, no congelar

MECANISMO DE ACCIÓN
Anticuerpo monoclonal anti-VEGF-A; inhibe la angiogénesis tumoral

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Riesgo de perforación intestinal, hemorragia y dehiscencia de herida: suspender 28 días antes de cirugía

APLICACIÓN O NIVEL DE ATENCIÓN
Hospitalario · centro de infusión o unidad especializada

COTIZAR AHORA

Whatsapp 5545546566



Nefixol

Ámpula de 1 mg

Vincristina ULSA TECH

INDICACIÓN
Leucemias agudas, linfomas, tumores pediátricos y esquemas PCV

PRESENTACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Ámpula de 1 mg · Vía intravenosa (infusión)

CONSERVACIÓN
CADENA DE FRÍO: refrigerado 2–8 °C, no congelar

MECANISMO DE ACCIÓN
Alcaloide de la vinca; inhibe la polimerización de microtúbulos

ADVERTENCIA IMPORTANTE
MORTAL POR VÍA INTRATECAL: solo intravenoso; neuropatía periférica dosis-limitante

APLICACIÓN O NIVEL DE ATENCIÓN
Hospitalario · centro de infusión o unidad especializada

COTIZAR AHORA

Whatsapp 5545546566



Zirabev

Ámpula de 400 mg / 16 mL

Bevacizumab PFIZER

INDICACIÓN
Cáncer colorrectal, pulmón, ovario, cérvix, renal y glioblastoma recurrente

PRESENTACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Ámpula de 400 mg / 16 mL · Vía intravenosa (infusión)

CONSERVACIÓN
CADENA DE FRÍO: refrigerado 2–8 °C, no congelar

MECANISMO DE ACCIÓN
Anticuerpo monoclonal anti-VEGF-A; inhibe la angiogénesis tumoral

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Riesgo de perforación intestinal, hemorragia y dehiscencia de herida: suspender 28 días antes de cirugía

APLICACIÓN O NIVEL DE ATENCIÓN
Hospitalario · centro de infusión o unidad especializada

COTIZAR AHORA

Whatsapp 5545546566



Zuriphar

Caja con 5 cápsulas de 100 mg · caja con 5 cápsulas de 20 mg

Temozolomida ZURICH PHARMA

INDICACIÓN
Glioblastoma multiforme y astrocitoma anaplásico, concomitante y adyuvante a radioterapia

PRESENTACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Caja con 5 cápsulas de 100 mg · Vía oral
Caja con 5 cápsulas de 20 mg · Vía oral

CONSERVACIÓN
Temperatura ambiente (15–25 °C), proteger de la luz


MECANISMO DE ACCIÓN
Agente alquilante oral que metila el ADN y atraviesa la barrera hematoencefálica

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Profilaxis contra Pneumocystis durante la fase concomitante; tomar en ayuno

APLICACIÓN O NIVEL DE ATENCIÓN
Ambulatorio · el paciente puede autoadministrarlo con capacitación

COTIZAR AHORA

Whatsapp 5545546566



Adcetris

Ámpula de 50 mg

Brentuximab Vedotina TAKEDA

INDICACIÓN
Linfoma de Hodgkin y linfoma anaplásico de células grandes CD30+

PRESENTACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Ámpula de 50 mg · Vía intravenosa (infusión)

CONSERVACIÓN
CADENA DE FRÍO: refrigerado 2–8 °C, no congelar

MECANISMO DE ACCIÓN
Anticuerpo conjugado anti-CD30 unido a monometil auristatina E

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Neuropatía periférica acumulativa; contraindicada la combinación con bleomicina

APLICACIÓN O NIVEL DE ATENCIÓN
Hospitalario · centro de infusión o unidad especializada

COTIZAR AHORA

Whatsapp 5545546566



Arasamila

Caja con 2 ámpulas de 100 mg / 10 mL

Rituximab SANDOZ

INDICACIÓN
Linfoma no Hodgkin, LLC, artritis reumatoide y vasculitis ANCA

PRESENTACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Caja con 2 ámpulas de 100 mg / 10 mL · Vía intravenosa (infusión)

CONSERVACIÓN
CADENA DE FRÍO: refrigerado 2–8 °C, no congelar

MECANISMO DE ACCIÓN
Anticuerpo monoclonal anti-CD20 que produce depleción de linfocitos B

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Reactivación de hepatitis B potencialmente mortal: tamizar HBsAg y anti-HBc siempre

APLICACIÓN O NIVEL DE ATENCIÓN
Hospitalario · centro de infusión o unidad especializada

COTIZAR AHORA

Whatsapp 5545546566



Epkinly

Frasco de 48 mg / 0.8 mL

Epcoritamab ABBVIE

INDICACIÓN
Linfoma difuso de células B grandes en recaída o refractario tras dos líneas

PRESENTACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Frasco de 48 mg / 0.8 mL · Vía subcutánea

CONSERVACIÓN
CADENA DE FRÍO: refrigerado 2–8 °C, no congelar

MECANISMO DE ACCIÓN
Anticuerpo biespecífico CD3xCD20; redirige linfocitos T contra la célula B

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Síndrome de liberación de citocinas: requiere escalamiento de dosis y vigilancia estrecha

APLICACIÓN O NIVEL DE ATENCIÓN
Hospitalario · centro de infusión o unidad especializada

COTIZAR AHORA

Whatsapp 5545546566



Glindeka

Ámpula de 100 mg / 4 mL

Bendamustina TEVA

INDICACIÓN
Linfoma no Hodgkin indolente, leucemia linfocítica crónica y mieloma múltiple

PRESENTACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Ámpula de 100 mg / 4 mL · Vía intravenosa (infusión)

CONSERVACIÓN
CADENA DE FRÍO: refrigerado 2–8 °C, no congelar

MECANISMO DE ACCIÓN
Agente alquilante bifuncional con propiedades de análogo de purina

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Linfopenia prolongada; considerar profilaxis antiviral y contra Pneumocystis

APLICACIÓN O NIVEL DE ATENCIÓN
Hospitalario · centro de infusión o unidad especializada

COTIZAR AHORA

Whatsapp 5545546566



Mabthera

Ámpula de 500 mg / 50 mL

Rituximab ROCHE

INDICACIÓN
Linfoma no Hodgkin, LLC, artritis reumatoide y vasculitis ANCA

PRESENTACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Ámpula de 500 mg / 50 mL · Vía intravenosa (infusión)

CONSERVACIÓN
CADENA DE FRÍO: refrigerado 2–8 °C, no congelar

MECANISMO DE ACCIÓN
Anticuerpo monoclonal anti-CD20 que produce depleción de linfocitos B

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Reactivación de hepatitis B potencialmente mortal: tamizar HBsAg y anti-HBc siempre

APLICACIÓN O NIVEL DE ATENCIÓN
Hospitalario · centro de infusión o unidad especializada

COTIZAR AHORA

Whatsapp 5545546566



Mekinist

Caja con 30 comprimidos de 2 mg

Trametinib NOVARTIS

INDICACIÓN
Melanoma y CPCNP con mutación BRAF V600, en combinación con dabrafenib

PRESENTACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Caja con 30 comprimidos de 2 mg · Vía oral

CONSERVACIÓN
CADENA DE FRÍO: refrigerado 2–8 °C, no congelar

MECANISMO DE ACCIÓN
Inhibidor selectivo y reversible de MEK1 y MEK2

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Vigilar FEVI, retinopatía serosa central e hipertensión

APLICACIÓN O NIVEL DE ATENCIÓN
Ambulatorio · el paciente puede autoadministrarlo con capacitación

COTIZAR AHORA

Whatsapp 5545546566



Opdivo

Ámpula de 100 mg / 10 mL

Nivolumab BRISTOL MYERS SQUIBB

INDICACIÓN
Melanoma, CPCNP, renal, urotelial, gástrico, hepatocarcinoma y linfoma de Hodgkin

PRESENTACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Ámpula de 100 mg / 10 mL · Vía intravenosa (infusión)

CONSERVACIÓN
CADENA DE FRÍO: refrigerado 2–8 °C, no congelar

MECANISMO DE ACCIÓN
Anticuerpo monoclonal anti-PD-1 que restaura la inmunidad antitumoral

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Toxicidad inmunomediada en cualquier órgano; puede aparecer meses después de suspender

APLICACIÓN O NIVEL DE ATENCIÓN
Hospitalario · centro de infusión o unidad especializada

COTIZAR AHORA

Whatsapp 5545546566



Tafinlar

Caja con 28 cápsulas de 75 mg

Dabrafenib GLAXOSMITHKLINE

INDICACIÓN
Melanoma y CPCNP con mutación BRAF V600, en combinación con trametinib

PRESENTACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Caja con 28 cápsulas de 75 mg · Vía oral

CONSERVACIÓN
Temperatura ambiente (15–25 °C), proteger de la luz

MECANISMO DE ACCIÓN
Inhibidor selectivo de la cinasa BRAF V600 mutada

ADVERTENCIA IMPORTANTE
No usar en tumores BRAF nativo: puede acelerar el crecimiento; fiebre frecuente

APLICACIÓN O NIVEL DE ATENCIÓN
Ambulatorio · el paciente puede autoadministrarlo con capacitación

COTIZAR AHORA

Whatsapp 5545546566



Tiferomed

Ámpula de 200 mg

Dacarbazina PISA

INDICACIÓN
Melanoma metastásico, linfoma de Hodgkin (esquema ABVD) y sarcoma

PRESENTACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Ámpula de 200 mg · Vía intravenosa (infusión)

CONSERVACIÓN
Temperatura ambiente (15–25 °C), proteger de la luz

MECANISMO DE ACCIÓN
Agente alquilante que metila el ADN tras activación hepática

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Vesicante: extravasación causa necrosis; náusea intensa que exige antiemesis potente

APLICACIÓN O NIVEL DE ATENCIÓN
Hospitalario · centro de infusión o unidad especializada

COTIZAR AHORA

Whatsapp 5545546566



Yervoy

Ámpula de 50 mg / 10 mL

Ipilimumab BRISTOL MYERS SQUIBB

INDICACIÓN
Melanoma avanzado, carcinoma renal y CPCNP, generalmente con nivolumab

PRESENTACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Ámpula de 50 mg / 10 mL · Vía intravenosa (infusión)

CONSERVACIÓN
CADENA DE FRÍO: refrigerado 2–8 °C, no congelar

MECANISMO DE ACCIÓN
Anticuerpo monoclonal anti-CTLA-4; potencia la activación de linfocitos T

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Alta tasa de toxicidad inmunomediada grave, sobre todo colitis e hipofisitis

APLICACIÓN O NIVEL DE ATENCIÓN
Hospitalario · centro de infusión o unidad especializada

COTIZAR AHORA

Whatsapp 5545546566



Filatil

Caja con 5 ámpulas de 300 mcg

Filgrastim PROBIOMED

INDICACIÓN
Neutropenia inducida por quimioterapia y movilización de células progenitoras

PRESENTACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Caja con 5 ámpulas de 300 mcg · Vía subcutánea

CONSERVACIÓN
CADENA DE FRÍO: refrigerado 2–8 °C, no congelar

MECANISMO DE ACCIÓN
Factor estimulante de colonias de granulocitos recombinante

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Dolor óseo frecuente; no aplicar en las 24 horas previas ni posteriores a la quimioterapia

APLICACIÓN O NIVEL DE ATENCIÓN
Ambulatorio · el paciente puede autoadministrarlo con capacitación

COTIZAR AHORA

Whatsapp 5545546566



Linkix

Jeringa de 6 mg / 0.6 mL

Lipegfilgrastim TEVA

INDICACIÓN
Prevención de neutropenia febril en pacientes con quimioterapia mielosupresora

PRESENTACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Jeringa de 6 mg / 0.6 mL · Vía subcutánea

CONSERVACIÓN
CADENA DE FRÍO: refrigerado 2–8 °C, no congelar

MECANISMO DE ACCIÓN
Factor estimulante de colonias glicopegilado de acción prolongada

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Dosis única por ciclo, 24 horas después de la quimioterapia; dolor óseo

APLICACIÓN O NIVEL DE ATENCIÓN
Ambulatorio · el paciente puede autoadministrarlo con capacitación

COTIZAR AHORA

Whatsapp 5545546566

Pelgraz

Jeringa de 6 mg / 0.6 mL

Pegfilgrastim ACCORD FARMA



INDICACIÓN
Prevención de neutropenia febril tras quimioterapia mielosupresora

PRESENTACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Jeringa de 6 mg / 0.6 mL · Vía subcutánea

CONSERVACIÓN
CADENA DE FRÍO: refrigerado 2–8 °C, no congelar

MECANISMO DE ACCIÓN
G-CSF pegilado de acción prolongada; estimula la producción de neutrófilos

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Dosis única por ciclo al menos 24 horas después de la quimioterapia; doloroso

APLICACIÓN O NIVEL DE ATENCIÓN
Ambulatorio · el paciente puede autoadministrarlo con capacitación

COTIZAR AHORA

Whatsapp 5545546566

Ziextenzo

Jeringa de 6 mg / 0.6 mL

Pegfilgrastim SANDOZ



INDICACIÓN
Prevención de neutropenia febril tras quimioterapia mielosupresora

PRESENTACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Jeringa de 6 mg / 0.6 mL · Vía subcutánea

CONSERVACIÓN
CADENA DE FRÍO: refrigerado 2–8 °C, no congelar

MECANISMO DE ACCIÓN
G-CSF pegilado de acción prolongada; estimula la producción de neutrófilos

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Dosis única por ciclo al menos 24 horas después de la quimioterapia; doloroso

APLICACIÓN O NIVEL DE ATENCIÓN
Ambulatorio · el paciente puede autoadministrarlo con capacitación

COTIZAR AHORA

Whatsapp 5545546566



Amal

Caja con 10 tabletas de 8 mg · Ámpula de 4 mg / 2 mL

Ondansetrón PROBIOMED

INDICACIÓN
Prevención de náusea y vómito por quimioterapia, radioterapia y posoperatorio

PRESENTACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Caja con 10 tabletas de 8 mg · Vía oral
Ámpula de 4 mg / 2 mL · Vía oral

CONSERVACIÓN
Temperatura ambiente (15–25 °C), proteger de la luz

MECANISMO DE ACCIÓN
Antagonista selectivo de los receptores 5-HT3 de la serotonina

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Prolongación del QT y estreñimiento; precaución con otros fármacos que alargan el QT

APLICACIÓN O NIVEL DE ATENCIÓN
Ambulatorio · el paciente puede autoadministrarlo con capacitación

COTIZAR AHORA

Whatsapp 5545546566



EmendIV

Ámpula de 150 mg

Fosaprepitant dimeglumina MERCK SHARP & DOHME

INDICACIÓN
Prevención de náusea y vómito agudo y tardío por quimioterapia emetógena

PRESENTACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Ámpula de 150 mg · Vía intravenosa (infusión)

CONSERVACIÓN
CADENA DE FRÍO: refrigerado 2–8 °C, no congelar

MECANISMO DE ACCIÓN
Profármaco intravenoso de aprepitant, antagonista del receptor NK1

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Dosis única previa a la quimioterapia; ajustar dexametasona por interacción CYP3A4

APLICACIÓN O NIVEL DE ATENCIÓN
Hospitalario · centro de infusión o unidad especializada

COTIZAR AHORA

Whatsapp 5545546566



Emend

Caja con 1 cápsula de 125 mg y 2 de 80 mg

Aprepitant MERCK SHARP & DOHME

INDICACIÓN
Prevención de náusea y vómito por quimioterapia altamente emetógena

PRESENTACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Caja con 1 cápsula de 125 mg y 2 de 80 mg · Vía oral

CONSERVACIÓN
Temperatura ambiente (15–25 °C), proteger de la luz

MECANISMO DE ACCIÓN
Antagonista del receptor NK1 de la sustancia P a nivel central

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Interacciona con dexametasona y warfarina por CYP3A4; ajustar dosis de corticoide

APLICACIÓN O NIVEL DE ATENCIÓN
Ambulatorio · el paciente puede autoadministrarlo con capacitación

COTIZAR AHORA

Whatsapp 5545546566



Gesent

Ámpula de 0.25 mg / 5 mL

Palonosetrón ZURICH PHARMA

INDICACIÓN
Prevención de náusea y vómito agudo y tardío por quimioterapia

PRESENTACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Ámpula de 0.25 mg / 5 mL · Vía intravenosa (infusión)

CONSERVACIÓN
Temperatura ambiente (15–25 °C), proteger de la luz

MECANISMO DE ACCIÓN
Antagonista 5-HT3 de segunda generación con vida media prolongada

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Cubre hasta 5 días con una sola dosis; vigilar QT y estreñimiento

APLICACIÓN O NIVEL DE ATENCIÓN
Hospitalario · centro de infusión o unidad especializada

COTIZAR AHORA

Whatsapp 5545546566



Xgeva

Ámpula de 120 mg

Denosumab AMGEN

INDICACIÓN

Prevención de eventos óseos por metástasis y osteoporosis de alto riesgo

PRESENTACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Ámpula de 120 mg · Vía subcutánea

CONSERVACIÓN

CADENA DE FRÍO: refrigerado 2–8 °C, no congelar

MECANISMO DE ACCIÓN

Anticuerpo monoclonal anti-RANKL; inhibe la formación y activación del osteoclasto

ADVERTENCIA IMPORTANTE

Osteonecrosis mandibular: valoración dental previa; hipocalcemia, suplementar calcio y vitamina D

APLICACIÓN O NIVEL DE ATENCIÓN

Ambulatorio · aplicación por personal de salud

COTIZAR AHORA

Whatsapp 5545546566



Alquifos

Ámpula de 1,000 mg

Ifosfamida ULSA TECH

INDICACIÓN
Sarcomas de tejidos blandos y óseos, tumores germinales y linfomas

PRESENTACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Ámpula de 1,000 mg · Vía intravenosa (infusión)

CONSERVACIÓN
Temperatura ambiente (15–25 °C), proteger de la luz

MECANISMO DE ACCIÓN
Agente alquilante de la familia de las oxazafosforinas

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Cistitis hemorrágica: obligatorio rescate con mesna e hidratación; neurotoxicidad

APLICACIÓN O NIVEL DE ATENCIÓN
Hospitalario · centro de infusión o unidad especializada

COTIZAR AHORA

Whatsapp 5545546566



Intici

Caja con 60 tabletas de 100 mg

Imatinib HETERO

INDICACIÓN
Leucemia mieloide crónica Ph+, LLA Ph+ y tumor del estroma gastrointestinal (GIST)

PRESENTACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Caja con 60 tabletas de 100 mg · Vía oral

CONSERVACIÓN
Temperatura ambiente (15–25 °C), proteger de la luz

MECANISMO DE ACCIÓN
Inhibidor de tirosina cinasa BCR-ABL, c-KIT y PDGFR

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Tomar con alimentos y abundante agua; edema periorbitario y calambres frecuentes

APLICACIÓN O NIVEL DE ATENCIÓN
Ambulatorio · el paciente puede autoadministrarlo con capacitación

COTIZAR AHORA

Whatsapp 5545546566



Votrient

Caja con 30 tabletas de 200 mg

Pazopanib GLAXOSMITHKLINE

INDICACIÓN
Carcinoma de células renales avanzado y sarcoma de tejidos blandos

PRESENTACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Caja con 30 tabletas de 200 mg · Vía oral

CONSERVACIÓN
Temperatura ambiente (15–25 °C), proteger de la luz

MECANISMO DE ACCIÓN
Inhibidor multicinasa de VEGFR, PDGFR y c-KIT

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Hepatotoxicidad grave: transaminasas cada 2 semanas los primeros 2 meses; tomar en ayuno

APLICACIÓN O NIVEL DE ATENCIÓN
Ambulatorio · el paciente puede autoadministrarlo con capacitación

COTIZAR AHORA

Whatsapp 5545546566



Yondelis

Ámpula de 1 mg

Trabectedina ASOFARMA

INDICACIÓN
Sarcoma de tejidos blandos avanzado y cáncer de ovario recurrente

PRESENTACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Ámpula de 1 mg · Vía intravenosa (infusión)

CONSERVACIÓN
CADENA DE FRÍO: refrigerado 2–8 °C, no congelar

MECANISMO DE ACCIÓN
Se une al surco menor del ADN, altera la transcripción y el microambiente tumoral

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Administrar por vía central; premedicar con dexametasona; vigilar CPK por rabdomiólisis

APLICACIÓN O NIVEL DE ATENCIÓN
Hospitalario · centro de infusión o unidad especializada

COTIZAR AHORA

Whatsapp 5545546566



Zuclodox

Ámpula de 50 mg

Doxorrubicina ZURICH PHARMA

INDICACIÓN
Cáncer de mama, linfomas, sarcoma, leucemias y tumores sólidos pediátricos

PRESENTACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Ámpula de 50 mg · Vía intravenosa (infusión)

CONSERVACIÓN
CADENA DE FRÍO: refrigerado 2–8 °C, no congelar

MECANISMO DE ACCIÓN
Antraciclina que intercala el ADN e inhibe la topoisomerasa II

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Cardiotoxicidad acumulativa (límite 450–550 mg/m2) y potente vesicante

APLICACIÓN O NIVEL DE ATENCIÓN
Hospitalario · centro de infusión o unidad especializada

COTIZAR AHORA

Whatsapp 5545546566



Aptimetyx

Caja con 30 tabletas de 20 mg

Cabozantinib IPSEN

INDICACIÓN
Carcinoma de células renales, hepatocarcinoma y cáncer medular de tiroides

PRESENTACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Caja con 30 tabletas de 20 mg · Vía oral

CONSERVACIÓN
Temperatura ambiente (15–25 °C), proteger de la luz

MECANISMO DE ACCIÓN
Inhibidor multicinasa de MET, VEGFR2, AXL y RET

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Tomar en ayuno; riesgo de perforación, fístula y hemorragia; hipertensión frecuente

APLICACIÓN O NIVEL DE ATENCIÓN
Ambulatorio · el paciente puede autoadministrarlo con capacitación

COTIZAR AHORA

Whatsapp 5545546566



Cryostatin

Ámpula de 1 mg / 5 mL

Octreotida CRYOPHARMA

INDICACIÓN
Acromegalia, tumores neuroendocrinos y síndrome carcinoide

PRESENTACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Ámpula de 1 mg / 5 mL · Vía subcutánea

CONSERVACIÓN
CADENA DE FRÍO: refrigerado 2–8 °C, no congelar

MECANISMO DE ACCIÓN
Análogo sintético de somatostatina; inhibe la secreción de GH y hormonas gastroenteropancreáticas

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Litiasis biliar con uso prolongado; vigilar glucemia y ultrasonido vesicular

APLICACIÓN O NIVEL DE ATENCIÓN
Ambulatorio · aplicación por personal de salud

COTIZAR AHORA

Whatsapp 5545546566



Octreotida

Ámpula de 1 mg / 5 mL

Octreotida PISA

INDICACIÓN
Acromegalia, tumores neuroendocrinos y síndrome carcinoide

MECANISMO DE ACCIÓN
Análogo sintético de somatostatina; inhibe la secreción de GH y hormonas gastroenteropancreáticas

PRESENTACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Ámpula de 1 mg / 5 mL · Vía subcutánea

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Litiasis biliar con uso prolongado; vigilar glucemia y ultrasonido vesicular

CONSERVACIÓN
CADENA DE FRÍO: refrigerado 2–8 °C, no congelar

APLICACIÓN O NIVEL DE ATENCIÓN
Ambulatorio · aplicación por personal de salud

COTIZAR AHORA

Whatsapp 5545546566



Sandostatina LAR

Jeringa de 20 mg (liberación prolongada) · jeringa de 30 mg (liberación prolongada)

Octreotida NOVARTIS

INDICACIÓN
Acromegalia, tumores neuroendocrinos y síndrome carcinoide

MECANISMO DE ACCIÓN
Análogo sintético de somatostatina; inhibe la secreción de GH y hormonas gastroenteropancreáticas

PRESENTACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Jeringa de 20 mg (liberación prolongada) · Vía subcutánea
Jeringa de 30 mg (liberación prolongada) · Vía subcutánea

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Litiasis biliar con uso prolongado; vigilar glucemia y ultrasonido vesicular

CONSERVACIÓN
CADENA DE FRÍO: refrigerado 2–8 °C, no congelar

APLICACIÓN O NIVEL DE ATENCIÓN
Ambulatorio · aplicación por personal de salud

COTIZAR AHORA

Whatsapp 5545546566